

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgilere, akıllı telefon/tablet veya bir karekod okuyucu ile karekodu tarayarak ulaşabilirsiniz.

KULLANMA TALİMATI

ARCALION 200 mg kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her tablet 200 mg Sulbutiamin içermektedir.

Yardımcı maddeler: Glikoz anhidr, Laktoz monohidrat (buzağı kaynaklı), Magnezyum stearat, Mısır nişastası, Kurutulmuş mısır nişastası macunu, Talk, Politetilen glikol 6000, Karmeloz sodyum, Etil selüloz, Gliserol oleat, Polisorbat 80, Povidon, Koloidal anhidr silis, Sodyum hidrojen karbonat, Sukroz, Boyar madde olarak Günbatımı sarısı FCF (E110) Alüminyum lak, Titanyum dioksit (E 171) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ARCALION nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ARCALION'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ARCALION nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ARCALION 'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır

1. ARCALION nedir ve ne için kullanılır?

- ARCALION, portakal rengine, mercimek şeklinde şeker kaplı 30 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır.
- ARCALION geçici yorgunluğunuzu gidermek için verilmiştir.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

2. ARCALION'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARCALION'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eęer etkin maddeye veya ARCALION'un ierdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).
- ARCALION 18 yařından küçük ocuklarda kullanılmaz.

ARCALION'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Belirtiler 4 haftadan uzun sürerse doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız

ARCALION'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Dozlar kahvaltı ve öğle yemeklerinde bölünerek büyük bir bardak su ile yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- ARCALION gerekli olmadıka gebelik döneminde kullanılmamalıdır. ARCALION'un ağızdan alınan kontraseptifler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- ARCALION emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

ARCALION'un ara ve makine kullanımı üzerinde alıřılan özel bir alıřma bulunmamaktadır.

ARCALION'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ila glikoz, laktoz ve sukroz iermektedir. Doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduęu belirtilmiřse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danıřmalısınız.

ARCALION, her tablette boyar madde olarak Gnbatımı sarısı FCF (E110) Alminyum lak ierdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Dięer ilalarla birlikte kullanımı

Dięer ilalar ARCALION ile tedaviyi etkileyebilir. Doktorunuz ilacın dozunu deęiřtirmeye ihtiya duyabilir ve/veya bařka önlemler alabilir. Ařağıdaki ilalardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

- Diretikler (İdrar sktrcler)
- Nromuskler bloke edici ilalar (Kas gevřeticiler)

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ARCALION nasıl kullanılır?**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı iin talimatlar:**

Gnde 2 veya 3 tablet, doktorunuzun önerdiği dozda alınız.

Tabletleri bütün olarak çiğnmeden bir bardak su ile yutunuz. Dozlar kahvaltı ve öğle yemeklerinde bölünerek alınabilir. Tedavi süresi 4 hafta ile sınırlıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Yukarıda belirtildiği gibi kullanılır. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Yukarıda belirtildiği gibi kullanılır. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ARCALION ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer ARCALION'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARCALION kullandıysanız

ARCALION'dan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, doktor veya eczacınıza danışınız.

ARCALION kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuzu hatırladığınızda bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

ARCALION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ARCALION'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

- Ajitasyon (huzursuzluk)
- Baş ağrısı,
- Deri döküntüsü
- Mide bulantısı,
- Kusma,
- Titreme
- Keyifsizlik, kırgınlık hali

Bilinmiyor:

- İshal
- Karın ağrısı

Boyar madde olarak Günbatımı sarısı içerdiğinden, alerji riski bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ARCALION'un saklanması

ARCALION'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARCALION'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., Maslak, Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri: Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
Esenyurt, İstanbul

Bu kullanma talimatı 03.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.