

KULLANMA TALİMATI

DAFLON 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon,
Diosmin.....450 mg
Hesperidin 50 mg
şeklinde ifade edilen flavonoid fraksiyonlarına eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler: Jelatin (sığır kaynaklı), magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, talk, gliserol, makrogol 6000, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, sodyum lauril sülfat, titanyum dioksit, sarı demir oksit, metilhidroksipropil selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **DAFLON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DAFLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DAFLON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **DAFLON 'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır

1. DAFLON nedir ve ne için kullanılır?

- DAFLON, 60 tableten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır.
- DAFLON Venotonik (venöz direnci artıran) ve vasküloprotektif ((küçük kan damarlarında direnç artıran) ilaç grubuna aittir.

DAFLON,

- Alt ekstremitelerin toplardamar yetersizliğinde:
 - Bacakta ağırlık hissi,
 - Ağrı
 - Gece gelen kramplar,
- Hemoroid (basur) krizlerine ait belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu ilaç sığır kaynaklı jelatin yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

2. DAFLON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAFLON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin maddeye veya DAFLON'un içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).

DAFLON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Akut hemoroid (basur) krizlerinde:

Tedavi kısa süreli olmalıdır. Hemoroid (basur) belirtileri 15 gün içinde geçmediği takdirde doktorunuza başvurulmalı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

- Toplardamar dolaşım hastalıklarında:

Bu ilaç sağlıklı bir yaşam çerçevesinde uygulanmalıdır. Güneşe ve sıcağa maruz kalmayınız, uzun süre ayakta durmayınız ve aşırı kilo almamaya özen gösteriniz. Yürüyüş ve destekleyici özellikte özel çorap giyilmesi kan dolaşımını uyarır.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız".

DAFLON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik süresince kullanımına doktor tarafından karar verilmeli ve tedbirli olunmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DAFLON araç veya makina kullanmanızı etkilemez ya da ihmal edilebilir derecede etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DAFLON'un herhangi bir ilaçla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ve lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DAFLON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Toplardamar yetersizliğinde: günde iki tablet, biri öğle diğeri akşam yemeği ile birlikte alınır.

Hemoroid (basur) krizlerinde. ilk 4 gün, günde 6 tablet; sonraki 3 gün, günde 4 tablet alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemek ile birlikte alınır. Tabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulur.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz DAFLON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Belirtiler devam ettiği sürece DAFLON ile tedavinize devam ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Bu yaş grubunda yeterli veri bulunmadığından DAFLON'un çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanımını önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer DAFLON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DAFLON kullandıysanız

DAFLON'dan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DAFLON'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

DAFLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DAFLON'un da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden biri olursa ilacı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, dudaklar, göz kapağında izole ödem.
- İstisna olarak Quincke ödemi (yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak halde şişmesi)

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:
İshal, hazımsızlık, bulantı, kusma

Yaygın olmayan:
Kalın bağırsak iltihabı

Seyrek:
Baş dönmesini de içeren sersemlik hali, başağrıları, kırıklık
Döküntü, kaşıntı, kurdeşen

Bilinmiyor:
Karın ağrısı,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DAFLON'un saklanması

DAFLON'u çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DAFLON'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
SERVIER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.,
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23
Maslak, İstanbul, Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretici: Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., Esenyurt, İstanbul

Bu kullanma talimatı 15.08.2019 tarihinde onaylanmıştır.